

Goliath® Gel

Isco insecticida em gel pronto a usar contendo 0,05% (p/p) de fipronil

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de Venda PT/DGS ARMPB 100/2016 concedida pela DGS

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da embalagem

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Atenção

EUH210 Ficha de segurança

fornecida a pedido

H400 Muito tóxico para organismos aquáticos

H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros

Indicações de Precaução

(Prevenção):

P101 Se for necessário consultar um médico, mostrar-lhe a embalagem ou rótulo

Indicações de precaução (Reacção):

P391 Recolher derramamentos

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telef.: 808 250 143.



Goliath® Gel é um insecticida pronto a usar em forma de gel usado para o controlo de baratas no interior de edifícios industriais, públicos e domésticos. Este produto só pode ser aplicado por operadores profissionais

Goliath® Gel é eficaz no controlo de baratas das espécies; Germânica (*Blattella germanica*), Oriental (*Blatta orientalis*), Americana (*Periplaneta americana*) e Castanha (*Supella longipalpa*). Nas fases de ninfa e adulto.

UTILIZAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

ESPÉCIE	INFESTAÇÃO BAIXA	INFESTAÇÃO ELEVADA
Barata Germânica (<i>Blattella germanica</i>)	0.03 g/m ²	0.06 g/m ²
Barata Oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	0.06 g/m ²	0.09 g/m ²
Barata Americana (<i>Periplaneta americana</i>)	0.06 g/m ²	0.09 g/m ²
Barata Castanha (<i>Supella longipalpa</i>)	0.03 g/m ²	0.06 g/m ²

Uma gota de 0,03 g de gel tem aproximadamente 3 - 4 mm de diâmetro. Os cartuchos de Goliath® Gel são destinados a serem usados com a pistola de aplicação BaitGun®.

Seguir sempre as instruções da BaitGun®.

O cartucho de Goliath® Gel deve ser colocado na BaitGun® e de seguida anexada a agulha para proceder à aplicação apropriada.

O Goliath® Gel deve ser aplicado na área infestada em pequenas gotas.

As gotas devem ser aplicadas em locais escuros, fendas, frestas, atrás dos armários e prateleiras, debaixo dos armários de cozinha; nas caixas dos eletrodomésticos, tubagens, debaixo das louças dos sanitários, etc. As gotas de gel não deverão ser expostas a zonas de calor (Luz Solar directa, radiadores, etc)

Não aplicar Goliath® Gel onde as gotas possam ficar submersas ou removidas aquando da limpeza de rotina. Não pulverizar com outros insecticidas sobre o Goliath® Gel ou à sua volta, ou nas superfícies recentemente tratadas com Goliath® Gel.

Os locais onde ocorreu o tratamento deverão ser identificados. Para optimização de resultados a área a tratar deverá estar limpa e arrumada, não deverão existir nas imediações fontes de comida, devendo as mesmas ser removidas.

Quantidade de produto aplicado deverá corresponder à dose recomendada

Devido à elevada sensibilidade da substância activa à luz solar, o produto deverá ser aplicado por forma a protegê-lo da luz solar directa, devendo ser utilizado em locais mais sombrios

As zonas tratadas deverão ser inspecionada semanalmente e caso tenha ocorrido consumo do Goliath® Gel este deverá ser repostado.

Para impedir o desenvolvimento de fenómenos de resistência deve-se à proceder à rotação dos produtos usados, devendo sempre recorrer a insecticidas com outros modos de acção

Deverão ser adoptados métodos integrados de gestão de pragas, recorrendo à combinação de métodos químicos, físicos e biológicos, tendo sempre em consideração as características climatéricas, espécies, condições de utilização etc, do local em tratamento. Não usar o Goliath® Gel em locais onde se suspeite que haja quebra de eficácia ou possam ter ocorrido fenómenos de desenvolvimento de resistência. Não usar o Goliath® Gel de forma continuada

 **BASF**
We create chemistry