

VEBITOX DIFE PASTA 10

Isco Raticida sob forma de pasta fresca pronta para o uso

Para uso profissional

COMPOSIÇÃO

100 g de produto contêm:

Difenacume (N. CAS 56073-07-5) g 0,005

Benzoato de Denatonio g 0,001

Diluentes substâncias atrativas e corantes q.b. a g 100



Detentor da autorização: VEBI Istituto Biochimico S.r.l.

Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (Padova) Itália - Tel. 049 9337111

Laboratório de produção: VEBI Istituto Biochimico S.r.l. Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (Padova)

PRODUTO BIOCIDA (PT14)

Autorização do Ministério de Saúde nºPT/ DGS ARMPB-025/2013

PRECAUÇÕES

Manter fechado para cima e fora do alcance de crianças. Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentação para animais. Quando usar, não coma, beba ou fume. Evite o contacto com a pele e os olhos. Usar luvas apropriadas. Em caso de ingestão, procure aconselhamento médico imediatamente (se possível mostrar rótulo). Evitar libertação no meio ambiente. Consultar a ficha de dados de segurança/instruções especiais.

INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO

MECANISMO DE AÇÃO: a substância ativa contida no produto é um competidor antagonista da vitamina K e reduz a síntese hepática dos fatores vitamina K-dependentes.

SINTOMAS: como resultado da ingestão de quantidades significativas de produto que provocam a inibição maciça da vitamina K, podem ocorrer hemorragias cutâneas, da mucosa e ao nível dos órgãos e parênquimas.

TRATAMENTO: no caso de ingestão de quantidades significativas de produto, induzir o vômito, fazer uma lavagem gástrica ou dar carvão ativado. Se a atividade de protrombina é reduzida, dar vitamina K. Coordenar o protocolo terapêutico com um Centro de Controlo Antivenenos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VEBITOX DIFE PASTA 10 é um isco raticida pronto para o uso à base de Difenacume, anticoagulante de segunda geração, eficaz contra ratos e ratazanas com uma única ingestão. A formulação de pasta macia, gorda, mas não untuosa, é constituída por componentes especiais, que incluem sementes de girassol, para obter a máxima eficácia contra todas as espécies de roedores Rato doméstico (*Mus musculus*), Rato cinzento (*Rattus norvegicus*), Rato preto (*Rattus rattus*) ainda que em presença de grande competição Alimentar

O produto não alerta nem cria desconfiança nos outros membros da população de roedores. Normalmente, a morte ocorre passados 4-5 dias da ingestão.

VEBITOX DIFE PASTA 10 contém uma substância amarga destinada a evitar a ingestão acidental de crianças. **VEBITOX DIFE PASTA 10 para uso profissional** pode ser utilizado no interior e à volta de

edifícios industriais (também nos depósitos de mercadorias e porões dos navios, vagões), edifícios rurais, civis e comunitários, escolas, casas, caves, garagens, armários e jardins, explorações pecuárias, aterros sanitários, áreas ao ar livre.

INSTRUÇÕES, MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSAGEM

Evitar tocar o produto com as mãos nuas, utilizar luvas apropriadas. O produto está pronto para o uso e deve ser utilizado de acordo com as doses indicadas abaixo. Quando o produto for usado em caixas monodose, aquando do posicionamento, deve-se cortar a película de proteção superior. Os iscos devem ser utilizados exclusivamente em caixas adequadas, invioláveis e devidamente marcadas, disponíveis no comércio, protegidas dos agentes atmosféricos, da ingestão de espécies não-alvo e da dispersão no ambiente.

Observar a área de infestação e colocar as caixas com os iscos nas tocas, ao longo dos percursos dos ratos e nos locais de maior presença. Para infestações de ratazanas usar pontos de isco com um máximo de 200 g de isco. Colocar os iscos a uma distância de 10 m e reduzi-la a 5 m para infestações maiores (60-200g x 10 m²). Uma vez colocados os iscos não os mova nem perturbe por alguns dias. Se não se notam sinais de atividade passados 7-10 dias, desloque os iscos para uma zona de maior atividade. Para infestações de ratos usar 20-40 g por cada ponto de isco. Colocar os iscos a cada 5 m reduzindo para 2 m em caso de infestações maiores (40g x 10 m²). Pode ser útil para a eficácia do tratamento mover os iscos a cada 2-3 dias quando os pontos forem inspecionados e/ou recarregados. Se necessário, substituir semanalmente os iscos nas caixas. Remover o mais cedo possível os animais mortos e eliminá-los segundo as normas previstas. Utilizar luvas durante o manuseamento dos animais mortos. O produto não é destinado ao uso permanente, organizar tratamentos que duram no máximo 6 semanas. No final do tratamento retirar as caixas e eliminar os iscos restantes segundo as normas vigentes.

RECOMENDAÇÕES

Durante a manipulação de roedores mortos, usar luvas de borracha. Ter sempre a certeza de que os recipientes estão protegidos adequadamente e que os iscos não podem ser arrastados para fora pelos roedores. Os pontos de isco devem ser removidos, numa campanha típica, seis semanas após a colocação inicial. Em caso de contaminação lave cuidadosamente as mãos com sabão e água abundante. Em caso de suspeita de ingestão consultar o Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) - tel: 808 250 143. Manter fora do alcance das crianças. Conserve o recipiente bem fechado. Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentação para animais. Guarde no recipiente original, bem fechado, num lugar seguro. O produto deve não ser reutilizado ou reciclado. O produto não consumido deve ser recolhido e eliminado em conformidade com as normas locais. Os resíduos dos iscos são resíduos perigosos.